Енвидор -инсектицид

Ростов-на-Дону, Россия

Енвидор®
Группа: Инсектициды Активный ингредиент: спіродиклофен 240 г/л
Препаративная форма: концентрат суспензии
Упаковка: 1 л
Регистрационное удостоверение: А № 02113
Енвидор® принадлежит к новому химического класса кетоенолов (тетрониковые кислоты).
Благодаря новому механизму действия-блокированию синтеза липидов - Енвидор® не
вызывает у вредителей перекрестной устойчивости с одним традиционным акарицидом.
Енвидор® является эффективным благодаря контактной действия против всех стадий развития
растительноядных клещей - яйца, личинки, протонімфи, дейтонімфи, а также против
взрослых самок. Самцы не наносят культуре вреда и хранятся как пищевые
объекты для хищных клещей.
Наиболее целесообразным сроком обработки против клещей следует считать раннюю, когда уровень
популяции низок, что позволит сэкономить на последующих обработках. Однако
Енвидор® демонстрирует высокую эффективность от начала до конца сезона вегетации,
поэтому его можно использовать также во время вспышки численности клещей.
СПЕКТР ОБЩЕЙ АКТИВНОСТИ
КЛЕЩИ
Паутинные (Tetranychidae)
· желтый яблоневый паутинный клещ (Eotetranychus pomi)
· садовый паувтинний клеща (Schizotetranychus pruni)
· обыкновенный паутинный клещ (Tetranychus urticae)
· красный цитрусовый клещ (Panonychus citri)
· красный плодовый клещ (Panonychus ulmi)
· красный тепличный клещ (Tetranychus telarius)
· боярышниковый клещ (Tetranychus viennensis)
· грабовой паутинный клещ (Schizotetranychus carpini)
· бурый плодовый клещ (Bryobia redicorzevi)
Галлу (войлочные) клещи (Eriophydidae)
· клещик Шлехтендаля (Aculus schlechtendali)
· виноградный зудень (Eriophyes vitis)
· грушевый галовий клещ (Eriophyes pyri)
· смородинний почковый клещ (Eriophyes ribis)
· різнокігтикові клещи (Tarsonomidae)
· земляничный клещ (Tarsonemus pallidus)
НАСЕКОМЫЕ
· Грушевая медяница (Psylla piri) - фаза желтого яйца.
· Комоподібна щитовка (Lepidosaphes ulmi) - фаза бродяжки.
ПРИМЕНЕНИЕ
ЯБЛОНЯ, - 0, 4-0, 6 л/га
Красный плодовый клещ, бурый плодовый клещ, боярышниковый клещ, грушевый галовий
клещ, медяницы, щитовки (фаза бродяжек), цикадки.

Обработка против мідяниць и щитовок обязательно с добавлением неионного прилипателя, например Меро опять - 0, 4 л/га
Максимальная кратность обработок - 2.
Срок ожидания - 20 дней.
Минимальные нормы следует использовать для школок и питомников, средние-для интенсивных садов на карликовых подвоях, максимальные - для садов на среднерослых подвоях. Расход рабочей жидкости должен быть как можно большим (культура способна удержать на поверхности).
- 0, 4 л/га
Красный плодовый клещ, паутинный клещ, виноградный зудень.
Максимальная кратность обработок - 2.
Срок ожидания - 20 дней.
СОЯ - 0, 4-0, 5 л/га
Паутинный клещ
Максимальное количество обработок - 2.
Срок ожидания - 20 дней.
Для обработки сои желательно использовать опрыскиватели с распылителями, которые создают турбулентные потоки распределения капель рабочей жидкости (для покрытия нижней поверхности листьев).
БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Енвидор® при условии правильного дозирования безвреден для пчел, хищных насекомых и клещей, почвенной фауны. Во время обработки необходимо соблюдать пространственных ограничений, обусловленных законодательством.
ПРЕИМУЩЕСТВА
· Новейшая химия с инновационным механизмом действия, активность против популяций, устойчивых к традиционных акарицидов.
· Долговременный контроль.
· Прилипания к листья (липофильные качества), высокая стойкость к осадкам.
· Широкое окно применение, меньшая зависимость от погодных условий (температуры, влажности воздуха, осадков).
· Гибкость применения, исключительный контроль всех важных видов.
· Прочная овіцидна активность, контроль всех подвижных стадий развития, эффективность против самок.
· Акарицид с высоким побочным уровнем эффективности против мідяниць, цикадок и щитовок.

Цена: Договорная | Тип объявления: Продам, продажа, продаю | Торг: --

Григорян Татьяна **+79897038890**