

## Ланнат- инсектицид плодовые овощные.

Ростов-на-Дону, Россия

ЛАННАТ 20Л

Молниеносное действие не оставляет вредителям шансов!

НОВЫЙ ИНСЕКТИЦИД ШИРОКОГО СПЕКТРА ДЕЙСТВИЯ С НЕПРЕВЗОЙДЁННЫМ НОКАУТИРУЮЩИМ ЭФФЕКТОМ, ДЛЯ БОРЬБЫ С ПЛОДОЖОРКОЙ И ЛИСТОВЁРТКАМИ НА ЯБЛОНЕ И ЛИСТОВЕРТКАМИ НА ВИНОГРАДЕ

ОПИСАНИЕ ПРЕПАРАТА И ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА

Действующее вещество: метомил, 200 г/л.

Препаративная форма: растворимый концентрат.

УПАКОВКА

Канистра 5л

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Надёжно контролирует широкий спектр вредителей

Быстродействие: 40% насекомых погибают в течение 15 минут; 70% в течение 1-го часа, 90% в течение 4-ёх часов

Контактно-кишечное действие

Активен на всех стадиях развития личинок, обладает контактной активностью против взрослых насекомых (бабочек) и яиц

Эффективен как в прохладную, так и в жаркую погоду

Возможно применение за 20 дней до уборки урожая

Отлично вписывается и дополняет существующие системы защиты винограда и яблони

СПЕКТР ДЕЙСТВИЯ

ЛАННАТ 20Л показывает высокую эффективность против виноградной листовёртки (*Sparganothis pilleriana*), гроздевой листовёртки (*Lobesia botrana*), листовёртки двулётной (*Eupoecilia ambiguella*), яблонной плодовой жоржки (*Cydia pomonella*), восточной плодовой жоржки (*Cydia molesta*), розанной листовёртки (*Archips rosana*), сетчатой листовёртки (*Adoxophyes orana*), зимней пяденицы (*Operophtera brumata*), листовёртки смородинной кривоусой (*Pandemis ribeana*), американской белой бабочки (*Hyrphantria cunea*). ЛАННАТ 20Л также эффективен против тлей, белокрылок, трипсов и цикадок. За пределами РФ ЛАННАТ 20Л применяется для защиты не только яблони и винограда, но и груши, персика, абрикосов, капусты, томатов, баклажан, лука, перца, огурцов, кабачков, дыни, салата, люцерны, кукурузы, хлопка, риса, сои, сахарной свёклы, пшеницы и других культур.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗАЩИТНОГО ДЕЙСТВИЯ

ЛАННАТ 20Л следует применять в рекомендованных дозировках превентивно в период отрождения первых личинок.

Опрыскиватель должен обеспечивать равномерное внесение, а количество рабочего раствора на 1 га должно быть достаточным, для того чтобы покрыть всю листовую поверхность. Интервал между обработками обычно составляет 10-12 дней.

---

Цена: Договорная

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Григорян Татьяна

**+79897038890**