

Евро Лайтинг - гербицид

Ростов-на-Дону, Россия

Евро - Лайтинг BPK - гербицид. заказать>>

Препаративная форма: Водорастворимый концентрат (ВРК) Действующее вещество:33г/л Имазамокс+ 15 г/л Имазапир

Детальное описание товара

Механизм действия

Препарат ингибирует энзим фцетолактатсинтазу (ALS). Этот энзим имеется только у растений и бактерий, его нет у животных. ALS является катализатором биосинтеза аминокислот: валина, лейцина и изолейцина.

Подавление образования ALS блокирует образование этих аминокислот и синтеза белка, что, в свою очередь, приводит к гибели сорных растений.

Подробная информация о культурах и заболеваниях:

Однолетние двудольные= 1, 0-1, 2 л/га

Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорняков (2-4 листьев) и 4-5 настоящих листьев у культуры. Ограничения по севообороту: можно высеивать пшеницу, рожь не ранее, чем через 4 месяца; люцерну, сою, ячмень, овес, кукурузу, горох — через 9 месяцев. Картофель, томаты, табак, лук, просо, салат, подсолнечник, огурцы, морковь можно высеивать через 19 месяцев, сахарную и столовую свеклу, рапс — через 26 месяцев. Расход рабочей жидкости — 200-300 л/га

Однолетние злаковые 1, 0-1, 2 л/га

Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорняков (2-4 листьев) и 4-5 настоящих листьев у культуры. Ограничения по севообороту: можно высеивать пшеницу, рожь не ранее, чем через 4 месяца; люцерну, сою, ячмень, овес, кукурузу, горох — через 9 месяцев. Картофель, томаты, табак, лук, просо, салат, подсолнечник, огурцы, морковь можно высеивать через 19 месяцев, сахарную и столовую свеклу, рапс — через 26 месяцев. Расход рабочей жидкости — 200-300 л/га

Информация для заказа

Способ упаковки: 10 л.





+79897038890